



Dual Effect KETTŐS HATÁSÚ HÜVELYTABLETTA

HÜVELYI FERTŐZÉSEK KEZELÉSÉRE

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (XE9322)

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a Használati utasítást! Tartsa meg ezt a Használati utasítást, hogy bármikor újra el tudja olvasni! Ha kérdése van, kérjük, forduljon háziorvosához vagy gyógyszerészéhez!

HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTA?

A hialuronsavat és laktitol-monohidrátot tartalmazó hüvelytabletta a vaginális fertőzés kezelésére szolgál. A hüvelytabletta kisméretű, kemény tablettá, amelyet mélyen a vaginába kell helyezni a természetes hüvelyflóra és az egészséges vaginális pH-érték fenntartása érdekében. A kezelés hatására megszűnik a fertőzés és a kellemetlen érzés. A hüvelytabletta mind gombák, mind pedig a baktériumok okozta fertőzések kezelésére alkalmas.

TUDNIVALÓK AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTA HASZNÁLATA ELŐTT

Ne használja a hüvelytablettát, ha

- Allergiás vagy túlérzékeny annak bármely összetevőjére.
- Teherbe kíván esni.

FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Az X-Epil Dual Effect hüvelytabletta kizárólag intravaginális használatra készült.
- Ne nyelje le a tablettát!
- Az alábbi esetekben konzultáljon háziorvosával:
 - A hüvelyfertőzés tünetei a kezelés megkezdése után 5 napon belül nem enyhülnek, vagy rosszabbodnak.
 - Véres a vizelete.
 - Hasi fájdalmai vannak.
 - A hüvelytabletta használata után kellemetlen hatást, például irritációt tapasztal.

AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTA EGYIDEJŰ ALKALMAZÁSA EGYÉB KEZELÉSEKKEL VAGY GYÓGYSZERREKKEL

A Használati utasítás betartása esetén a készítménynek nincs ismert kölcsönhatása más hüvelyfertőzés elleni kezeléssel vagy egyéb gyógyszerrel. Ennek ellenére, mielőtt együttesen alkalmazná a hüvelytablettát más készítményekkel, ajánlott megkérdezni háziorvosát vagy gyógyszerészét.

KI HASZNÁLHATJA AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTÁT?

A hüvelytablettát 16 év feletti nők használhatják. A terhesség vagy szoptatás idején történő alkalmazás biztonságossága nem ismert. A hüvelytabletta használata előtt konzultáljon háziorvosával! Ha teherbe kíván esni, a hüvelytabletta használata előtt kérjen időpontot háziorvosától! Az X-Epil Dual Effect hüvelytabletta fogamzóképesre gyakorolt hatása nem ismert.

HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTÁT?

A kezelést ajánlott a hüvelyfertőzés első jelei vagy tünetei után a lehető leghamarabb megkezdni. Legjobb a menstruáció után kezdeni a kezelést. Bár a hüvelytabletta a menstruáció alatt is alkalmazható, az esetleges erős vérzés miatt a tablettá kikerülhet a vaginából, ami sikertelenné teheti a kezelést.

A hüvelytabletta a tamponhoz hasonlóan, egyszerűen felhelyezhető a hüvelybe. Mielőtt egy tablettát kivenne a bliszterből, mosson kezet szappannal és vízzel, majd mélyen helyezze fel a tablettát a hüvelybe. Előfordulhat, hogy az X-Epil Dual Effect hüvelytabletta nem oldódik fel teljesen a hüvelyben, és egy része távozik. Ez nem csökkenti a kezelés hatékonyságát. A fehérműfoltok elkerülése érdekében a kezelés alatt ajánlott tisztasági betét használata. A tablettát lehetőleg lefekvés előtt helyezze fel!

	Adagolás	Időtartam
Kezelés	1 tablettá naponta	7 nap

A hüvelyi fertőzés tünetei már 30 percen belül enyhülhetnek.* A tünetek akár 3 napi használat után megszűnhetnek.** Ennek ellenére, folytassa a tablettá alkalmazását a javasolt kezelési idő végéig, hogy megelőzze a tünetek kiújulását. Ha a tünetek az első 7 napi kezelés után enyhülnek, de nem szűnnek meg teljesen, akkor újabb 7 napig alkalmazható a kezelés.

Ha a tünetek a kezelés megkezdése után 5 napon belül nem enyhülnek, vagy rosszabbodnak, forduljon orvosához!

A kezelés a menstruáció ideje alatt is folytatható. Erős vérzés esetén azonban csökkenhet a tablettá hatékonysága.

MI A HÜVELYFERTŐZÉS?

A hüvelyfertőzés komoly egészségügyi problémát jelent, amely életük során a nők 75%-át is érintheti legalább egy alkalommal. A nagy valószínűséggel kiújuló hüvelyfertőzést a hüvelyflóra

normál egyensúlyának felborulása és a kórokozók elszaporodása okozza. A hüvelyfertőzést baktériumok és gombák is okozhatják: a bakteriális vaginózis leggyakoribb kiváltó oka a Gardnerella vaginalis, míg a gombás fertőzést leginkább a Candida albicans idézi elő. A hüvelyflóra egyensúlyát számos tényező befolyásolhatja, például az intim területet szappannal való mosása, túl hosszú ideig benn hagyott tampont, legyengült immunrendszer, antibiotikum, méhen belüli eszköz vagy fogamzásgátló tablettá használata. A hüvelyi pH-érték emelkedése miatt egyes baktériumok túlszaporodhatnak. A hüvelyfertőzés tünetei közé tartozik a viszketés, égető érzés, kellemetlen szag, vagy rendellenes hüvelyi folyás (sima, fehér, szürke vagy sárga). Spermaával történő érintkezés után a szag rosszabbodhat.

MELYEK AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTA LEHETŐSÉGES MELLÉKHATÁSAI?

A hüvelytabletta enyhe irritációt okozhat. Ez csak átmeneti hatás, amely idővel várhatóan megszűnik. Ha aggódik, konzultáljon háziorvosával!

MELYEK AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTA ÖSSZETEVŐI?

Hialuronsav (nátrium-hialuronát formájában), laktit-monohidrát, polietilén-glikol 6000, bórsav, citromsav, kroszpovidon, magnézium-sztearát.

HOGYAN KELL TÁROLNI AZ X-EPIL DUAL EFFECT HÜVELYTABLETTÁT?

 Az eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten (15-25 °C) tárolja!

 Gyermektől elzárva tartandó!

 A levél és a külső dobozon feltüntetett lejárati idő után ne használja!

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?

A csomag 7 db hüvelytablettát tartalmazó blisztert és Használati utasítást tartalmaz.

Gyártó: Medical Brands Developments B.V., Weesperstraat 114, 1112 AP Diemen, the Netherlands.

Forgalmazó: Alveola Kft.
H-1143 Budapest, Gizella u. 28/A
www.x-epil.hu

A használati utasítás legutóbbi frissítése:
2021. március

 0477

A HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

	A termék használata előtt olvassa el a használati útmutatót
	Gyártói információk
	Gyermektől elzárva tartandó
	A terméket biztonságos, száraz és sötét helyen, szobahőmérsékleten (15-25°C) kell tárolni.
	A termék a lejárati idő után nem használható.
	A termék gyártási száma
	Különös figyelmet kell fordítani a figyelmeztetésekre
	A megfelelőségi eljárásban részt vevő tanúsító szervezetet azonosító négyjegyű CE-jelzés. A CE-jelzés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó Európai Direktíva előírásainak.

* A vizsgálatban részt vevő nők 1/3-ának beszámolója alapján.
Forrás: 94 nő bevonásával végzett klinikai vizsgálat, Medical Brands, 2020

** 94 nő bevonásával készült klinikai vizsgálat, Medical Brands, 2020